- прво прихрањивање извршити у марту,

- друго крајем априла,

- и треће крајем маја.

За прихрањивање садница користити минерална ђубрива, комплекса НПК и то за свако прихрањивање 50гр по стаблици, односно 20гр за шибље. Поред овога извршити још једно прихрањивање са азотним ђубривом и то амонијум сулфатом - 50гр за дрвеће и 25гр за шибље.

Чишћење, односно плевљење корова и редовно грабуљање, кошење и ваљање травњака.

Заливање садница. Након садње саднице заливати свакодневно до истека два месеца. После истека тог рока заливање редуцирати на три пута недељно (по потреби), а после у другој години свести на два заливања током једне недеље (уколико временски услови то изискују).

За све ове радове у току једне године потребно је 20% од укупне вредности за садњу садница и подизање травњака.

Обрачунато - паушално, односно 20% од укупне цене зеленила и травњака, а рачуна се за период до техничког пријема радова, а не више од годину дана.

ТРАВЊАК

ПРОЛЕЋЕ

1. Прва и основна операција у рано пролеће је аерисање (прозрачивање-проветравање) . Временом земљиште које је прекривено травним покривачем се слеже (сабија), поготово ако се травњак интензивно користи (изложен гажењу, итд.), долази до мањка кисеоника који је неопходан биљкама за дисање преко кореновог система, због чега се врши ова операција. Постоје различити типови како мануелног тако и аутоматског алата. За мануелно могу се користити виле тако што се убадају у земљиште до дубине 3-5 цм и грабуље којима се рстресе површински слој земљишта уклони сува органска материја (трава, лист, гранчице), маховина, ризоми корова. Може се рећи да се на овај начин травњак "растури". И дефинитивно изгледа лошије него пре интервенције.

2. Ђубрење. Пролећно ђубрење треба извести са минералним ђубривима богатијим са азотом (N). Азот даје боју трави (стимулише хлорофил) и трава брже расте, виталнија је.

Постоје основна минерална ђубрива KAN, NPK. Најјефтинија су, имају своје мане али престављају основно ђубриво за травњаке. Брзо се разлажу и